

FOLHETO INFORMATIVO

INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

OSCILLOCOCCINUM, glóbulos

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é OSCILLOCOCCINUM, glóbulos e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
3. Como tomar OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O QUE É Oscillococcinum, glóbulos E PARA QUE É UTILIZADO

Caixa de seis ou trinta recipientes unidos de 1 g de glóbulos.

Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no alívio de estados gripais e dos sintomas decorrentes tais como febre, dores de cabeça, arripios, dores musculares e afins.

Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem de consultar um médico.

2. O QUE PRECISA DE SABER ANTES DE TOMAR Oscillococcinum, glóbulos

Não tome OSCILLOCOCCINUM, glóbulos

Se tem alergia (hipersensibilidade) à substância ativa ou qualquer outro componente de OSCILLOCOCCINUM, glóbulos (indicados na secção 6).

Advertências e precauções

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Outros medicamentos e OSCILLOCOCCINUM, glóbulos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Gravidez e aleitamento

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

OSCILLOCOCCINUM, glóbulos contém sacarose, lactose.

3. COMO TOMAR Oscillococcinum, glóbulos

Via sublingual.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Adultos e crianças

A dosagem deve ser ajustada de acordo com a fase da doença:

- Prevenção: uma dose semanal durante o período de exposição à gripe.
- Estado gripal no início: uma dose de imediato. Repetir duas a três vezes com 6 horas de intervalo.
- Estado gripal declarado: uma dose de manhã e à noite durante 1-3 dias.

Na persistência dos sintomas para além dos 3 dias, deverá consultar o seu médico.

Coloque a totalidade do conteúdo do recipiente debaixo da língua e deixe dissolver. Crianças até 6 anos: dissolver os glóbulos num pouco de água, para evitar o risco de engasgamento.

Se tomar mais OSCILLOCOCCINUM, glóbulos do que deveria
Consulte o seu médico ou farmacêutico para obter conselhos.

Caso se tenha esquecido de tomar OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, OSCILLOCOCCINUM, glóbulos pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através:

INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 71 40
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet:
<http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. COMO CONSERVAR OSCILLOCOCCINUM, glóbulos

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize OSCILLOCOCCINUM, glóbulos após o prazo de validade impresso na caixa.

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM E OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de OSCILLOCOCCINUM, glóbulos

Para um recipiente unidose de 1 g de glóbulos:

Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200K 0,01 ml

Os outros componentes são: sacarose, lactose.

Qual o aspeto de OSCILLOCOCCINUM e conteúdo da embalagem

Recipientes unidose de 1 g de glóbulos.

Caixa de seis ou trinta recipientes unidose.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

França

Fabricante

BOIRON

20 rue de la Libération

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

França

Este folheto foi aprovado pela última vez em {MM/AAAA}.